

PRZYGOTOWANIE DO SCYNTYGRAFII NEREK

- nie trzeba być na czczo
- w czasie badania może zaistnieć potrzeba podania dożylnie leku moczopędnego, który może wywołać uczucie nagłego parcia na pęcherz: osoby z problemami z utrzymaniem moczu proszone są o przyniesienie ze sobą/założenie tzw. pampersa lub jednorazowych majtek chłonnych, które nie pozwolą na ewentualne zabrudzenie odzieży i sprzętu moczem
- kobiety powinny zawsze informować lekarza i technika o ciąży lub karmieniu piersią
- pozostawić biżuterię i akcesoria w domu lub zdjąć je przed badaniem, przedmioty te mogą zakłócać procedurę
- zabrać ze sobą dokumentację medyczną, w szczególności płyty CD z innych badań obrazowych jak tomografia komputerowa, PET, rezonans magnetyczny i/lub poprzednie wyniki badania limfoscyntygrafii o ile były wykonywane w innej pracowni niż nasza

Po badaniu można zazwyczaj powrócić do normalnej diety i codziennych czynności, chyba że lekarz zaleci inaczej. Radioizotop opuści organizm w sposób naturalny. Częste picie płynów i oddawanie moczu może przyspieszyć ten proces.